

KINESITHERAPEUTISCHE BEHANDELING NA EEN ARTHROSCOPISCHE VOORSTE KRUISBAND RECONSTRUCTIE MET MEDIAAL BANDLETSEL Immobilisatie:

NAAM PATIENT:

Aantal sessies: 30 – 60

Sessies per week: 3-5/week

Datum:

* 0-2 weken postoperatief:

- postop kniebrace gefixeerd op 10° flexie dag en nacht
- tijdens het oefenen mag brace los van 0°-90°

* 3-6 weken postoperatief: postop kniebrace dag en nacht los van 0° tot 90°

* na 6 weken postoperatief: Postop kniebrace progressief verwijderen en (zo nodig) vervangen door revalidatiebrace

Gangrevalidatie:

* enkel PLANTAR TOUCH (juist met voet op de grond) steunname op het been is postoperatief toegelaten gedurende *eerste 4 weken* (afhankelijk van pijn en zwelling)

* 4-6 weken: progressief meer belasten, maar gebruik van 2 krukken

Bij goede quadriceps/hamstrings controle mogen krukken progressief afgebouwd worden na 6 weken.

Mobiliteit:

* patellamobilisaties (minimum gedurende 8 weken)

* **vanaf 3^e week postoperatief:** 1x/dag mag de knie passief en onder begeleiding volledig naar *extensie* gebracht worden om een kapsulaire extensiebeperking tegen te gaan.

* progressieve actieve en passieve mobilisaties in *flexierichting*:

- 0-3 weken postoperatief: van 0° tot 90° flexie

- 3-6 weken postoperatief: van 0° tot 110° flexie

- na 4 weken: normaliseren van beweeglijkheid (geen doorgedreven flexie)

Oefentherapie:

* 0-4 weken postoperatief:

- kuitspieroefeningen + hamstringsoefeningen

- cocontracties hamstrings/quadriceps

* *vanaf 4de week postoperatief:*

- hamstringstonificatie
- quadricepstonificatie in gesloten keten oefeningen

In de onmiddellijke postoperatieve fase is er nog geen sprake van krachttraining. De oefeningen dienen aan lichte intensiteit aangevat te worden (50% van maximale kracht) en progressief opgedreven tot 60-70%.

De gesloten keten oefeningen moeten opgebouwd worden vanuit minder belaste posities (fiets, legpress, steps) naar meer belaste uitgangshoudingen (vb. squat). De progressie in de oefentherapie is afhankelijk van pijn, zwelling en quadricepscontrole.

Proprioceptie en coördinatie oefeningen:

- * kunnen vanaf de *4e-5e week* opgestart worden indien de analytische kracht goed is
- * oefeningen op plankjes, tol, trampoline
- * evenwichtoefeningen, uitvalsbewegingen in voorachterwaartse en zijwaartse richting

Functionele oefeningen:

* *na 3 maand:*

- looptraining progressief opbouwen
- sprongoefeningen
- bewegingen in verschillende richtingen (voorachterwaartse en zijwaartse verplaatsingen)

* *na 4-5 maand:*

- sportspecifieke oefeningen

Sporthervatting:

* *na 5-6 weken :*

- aquatraining
- zwemmen (crawl)
- fietsen

* *na 3 maand:* looptraining

* *na 6 maand :* sporthervatting

* *na 9 maand :* competitie

De aangeduide tijdstippen zijn slechts indicatief en dienen aangepast te worden aan de mogelijkheden en eventuele revalidatieproblemen van de patiënt.

Uitzonderingen:

Bij revisies van voorste kruisband, geassocieerde kraakbeenletsels, Meniscushechtingen wordt in samenspraak met de chirurg geopteerd voor een restrictief beleid (zie medisch voorschrift en aanpassingen in revalidatieschema).

Nomenclatuur: 294125N500

Stempel arts

Dr. KOEN LAGAE
1/34420/22/480

Unica Hospital

Stempel arts

Info: www.knee.be

© Prof. Dr. Peter Verdonk

Prof. Dr. PETER VERDONK
1/47062/87/480

7